

"Beschikbare geneesmiddelen (situatie 12/2017) voor de behandeling van myeloompatiënten in België"

| | Merksnaam | Beschikbaarheid: ND = nieuw gediagnosticeerde, HP = Hervallen patiënt / terugbetaling | Toediening weg | Frequent gebruikte schema's afkorting | voluit |
|-------------------------------|-------------|---|--------------------|--|---|
| Proteasoom-inhibitoren | | | | | |
| Bortezomib | Velcade | ND, HP zowel jonge als oudere patiënten | Subcutane injectie | VTD VMP VD VCD of CyBorD | Bortezomib-thalidomide-dexamethasone Bortezomib-melfalan-prednisone Bortezomib-dexamethasone Bortezomib-cyclofosfamide-dexamethasone |
| Carfilzomib | Kyprolis | HP (zowel jong/oud), in combinatie met len-dex (terugbetaald) (Dosis carfilzomib tot 27 mg/m ²) HP (zowel jong/oud), in combinatie met dex (terugbetaald sinds 01/05/2017) (Dosis carfilzomib tot 54 mg/m ²) | IV infuus | KRD KD | Carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone Carfilzomib-dexamethasone |
| Ixazomib | Ninlaro | Terugbetaald in België sinds 1/10/2017 bij HP in combinatie met len-dex Wekelijkse inname (4 mg pil) | Oraal | IRD | Ixazomib-lenalidomide-dexamethasone |
| Immuno-modulatoren | | | | | |
| Thalidomide | Thalidomide | ND, HP zowel jong/oud | Oraal | VTD TD | Bortezomib-thalidomide-dexamethasone Thalidomide-dexamethasone |
| Lenalidomide | Revlimid | ND oudere patiënten (niet transplant eligibel) HP (zowel jong / oud) | Oraal | RD KRD | Lenalidomide-dexamethasone Carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone |
| Pomalidomide | Imnovid | HP na eerder gebruik van zowel bortezomib, lenalidomide als een alkylator (vanaf 3e lijn) | Oraal | PD | Pomalidomide - dexamethasone |
| Antilichamen | | | | | |
| Daratumumab | Darzalex | HP na vroeger gebruik van bortezomib en lenalidomide (vanaf 3e lijn) Enkel terugbetaald in combinatie met dexamethasone | IV infuus | Dara-Dex | Daratumumab-dexamethasone |
| Elotuzumab | Empliciti | Terugbetaald in België sinds 1/9/2017 bij HP in combinatie met len-dex | IV infuus | Elo-RD | Elotuzumab-lenalidomide-dexamethasone |
| Alkylatoren | | | | | |
| Melfalan | Alkeran | Nieuw gediagnosticeerde, hervallen, zowel jonge als oudere patiënten Gebruik als chemotherapie bij autologe stamceltransplantatie Hoog gedoseerd : 200 mg/m ² lichaamsoppervlak voor afname stamcellen | Oraal IV | MP VMP | Melfalan-prednisone Bortezomib-melfalan-prednisone |
| Cyclofosfamide | Endoxan | Nieuw gediagnosticeerde, hervallen, zowel jonge als oudere patiënten Hoog gedoseerd : voor afname stamcellen | Oraal IV | VCD | Bortezomib-cyclofosfamide-dexamethasone |
| Bendamustine | Levact | ND oudere (niet transplant eligele patiënten) met voorafbestaande ernstige neuropathie | IV | BD | Bendamustine-dexamethasone |
| HDaC inhibitoren | | | | | |
| Panobinostat | Farydak | HP, na bortezomib en lenalidomide; steeds in combinatie met bortezomib-dexamethasone | Oraal | PVT | Panobinostat-Bortezomib-dexamethasone |

Aangeboden door:



Universitair Ziekenhuis Brussel

